



Stoller International
Unleashing The Power of Plants

SUGAR MOVER

Manufactured by Stoller International, Inc.
9090 Katy Freeway, Suite 400
Houston, Texas 77024 USA
Phone: 1-800-539-5283 or 713-461-1493 Fax: 713-461-4467
E-Mail: stoller@stollerusa.com



Stoller®Ukraine

ШУГА МУВЕР
(SUGAR MOVER), р.
(В – 8,0%, Мо – 0,004%)
Мінеральне добриво

Призначення: добриво для живлення рослин мікроелементами.

Класифікація ВООЗ, токсичність: за параметрами токсикометрії відноситься до малонебезпечних речовин (4 клас небезпечності) згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки праці. Вредні речовини. Класифікація в об'єкти вимог безпеки»; чинить слабку подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей, не проявляє сенсибілізуючих властивостей.

Сумісність з іншими препаратами: сумісне з більшістю пестицидів.

Примітання та норма витрати препарату, робочого розчину: робочий розчин готується безпосередньо перед початком підживлення, ретельно перемішати перед використанням.

Рекомендації щодо застосування: не застосовувати, якщо упродовж години після застосування очікується дощ, оскільки це знижує ефективність добрива.

Вимоги щодо зберігання, перевезення: Зберігають окремо від отрутохімікатів та харчових продуктів у темному, захищеному від атмосферних опадів приміщенні при нормальній вологості від 60% до 75% та температурі від +35 С у закритій заводській упаковці з етикеткою. При зберіганні не допускати порушення герметичності тари з метою попередження розливу продукту. Зберігайте хімікати в підсобних приміщеннях. Уважно огляньте контейнер перед зберіганням продукту, переконайтесь, що всі контейнери промарковані і не пошкоджені. Контейнер повинен бути щільно закритий. Транспортуйте автомобільним, залізничним та морським транспортом у відповідності з правилами перевозок небезпечних вантажів, що діють на транспорті даного виду з нанесенням маніпуляційного знаку «Берегти від вологи».

Перша медична допомога: при потрапленні від сильного впливу хімікатів повинні бути негайно доставлені в організацію охорони здоров'я для надання їм медичної допомоги. У разі необхідності викликати рятувальників. У потерпілого повинні бути при собі етикетка та копія Паспорта безпеки.

ОЧІ: тримаючи повинні відкритими, негайно промити очі великою кількістю води протягом 15 хвилин. Звернутися за медичною допомогою у разі виникнення сильного роздратування.

ШКІРА: негайно промити уражену ділянку водою з великою кількістю мила. Зняти забруднений одяг, не чіпати очі. Звернутися за медичною допомогою у разі виникнення сильного подразнення.

ОРГАНИ ДИХАННЯ: перемістити потерпілого на свіже повітря. При необхідності скористатися додатковим джерелом кисню. Переконатися, що слизо не утрудняє доступ повітря. Звернутися за медичною допомогою, якщо дихання утруднене.

ПРОКОВТУВАННЯ: негайно зв'язатися з лікарем для консультації. Викликати біологу. Потерпілий повинен випити молоко, білок яєць або велику кількість води. Ніколи не давайте нічого людині, що знаходиться без свідомості, в конвульсіях або не може ковтати.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: інформація для лікарів: симптоматичне лікування.

Заходи та засоби знешкодження залишків препарату та знищення тари: спеціальних методів знешкодження не потребує у зв'язку з необмеженим строком агрохімічної придатності. Відходи збирають в тару і направляють в технологічний процес або на утилізацію. Тару знешкоджують відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію Міністерства на проведення таких робіт.

В сільському господарстві добриво застосовується з нормами витрати відповідно до таблиці:

| Культура, об'єкт, що обробляється | Норма витрат препарату | Спосіб, час обробки, обмеження |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Зернові колосові | 1-2 л / га | Позакореневе підживлення |
| Кукурудза | 1-2 л / га | Позакореневе підживлення |
| Сов | 1-2 л / га | Позакореневе підживлення |
| Соняшник | 1-2 л / га | Позакореневе підживлення |
| Цукровий буряк | 1-2 л / га | Позакореневе підживлення |
| Ріпак | 1-2 л / га | Позакореневе підживлення |
| Картопля | 1-2 л / га | Позакореневе підживлення |
| Овочі | 1-2 л / га | Позакореневе підживлення |

Для особистих підсобних господарствах добриво застосовується з нормами витрати відповідно до таблиці:

| Культура, об'єкт, що обробляється | Норма витрат препарату | Спосіб, час обробки, обмеження |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Картопля | 10-20 мл / 100м2 | Позакореневе підживлення |
| Овочі | 10-20 мл / 100м2 | Позакореневе підживлення |

До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватися інструкції щодо застосування.

Виробник / Manufactured by: «СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЛ, ІНК. / STOLLER INTERNATIONAL, INC.

Юридична адреса виробовця / Legal address: 9090 Keri Freeway, Suite 400, Houston, Texas 77024 USA

Тел.: +1 (703) 527-3887

Номинальний об'єм / Actual Volume: 4 л / 4 л

Номер реєстраційного Посвідчення / State Registration Series A No.: 0052

Номер партії / Batch No.:

Дата виготовлення / Date of Manufacture:

Гарантийний термін зберігання / Best before: 3 роки (3 years)

Термін придатності / Shelf life: необмежений / not limited



Stoller®Ukraine